<1> 임시마약류 지정(1종) 공고 물질 상세자료

<지정사유 내용>
가. 구조적・효과적 분류군, 나. 약리효과(중추신경계 자극, 흥분, 억제 등), 다. 부작용 및 유해사례, 라. 국내 반입・유통 여부, 마. 국외 유통 및 규제현황

○ 다음의 것과 그 염과 이성체 또는 이성체의 염으로 한다.

연번	물질명	화학명칭	지정사유	구분
1	1cP-LSD	N,N-diethyl-7-methyl-4-cyclopropanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]-quinoline-9-carboxamide	가. (구조) (hetero)arylalkylamine (효과) hallucinogen 나. 보고된 바 없음 다. LSD(가목 향정)와 환각 등의 효과가 유사(사용자 보고) 라. 네덜란드發 통상우편으로 국내 반입 적발 마. 주요국(미국, 영국, 독일, 일본, 호주) 미규제	2

<2> 임시마약류 지정(6종) 예고 물질 상세자료

<지정사유 내용>
가. 구조적・효과적 분류군, 나. 약리효과(중추신경계 자극, 흥분, 억제 등), 다. 부작용 및 유해사례, 라. 국내 반입・유통 여부, 마. 국외 유통 및 규제현황

○ 다음의 것과 그 염 및 이성체 또는 이성체의 염으로 한다.

연번	물질명	화학명칭	지정사유	구분
1	W-18	4-chloro-N-[1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylindene]benzenesulfonamide	가. (구조) arylsulfonamide, (효과) 오피오이드 나. 중추신경계 작용 다. 동물실험에서 동 물질의 진통작용이 몰핀의 약 10,000배로 나타남. 캐나다에서 동 물질 과량복용 관련 사망사례 1건 보고 라. 정보 없음 마. 캐나다, 스웨덴 규제	2
2	Ethylnaphthidate (HDEP-2)	ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate	가. (구조) phenethylamine, (효과) 암페타민 나. 중추신경계 작용 다. 동 물질 단독 독성으로 인한 사망사례 1건, 불안, 편집증, 시각왜곡, 흉통 발생 사례 보고 라. 정보 없음 마. 영국(임시마약류), 일본(지정약물) 규제	2
3	4-Methylmethylphenidate	methyl (2R)-2-(4-methylphenyl)-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetate	가. (구조) phenethylamine, (효과) 암페타민 나. 중추신경계 작용 다. 사용자 보고에 따르면 다행감, 발한, 환각, 환청 등의 증상이 나타남 라. 정보 없음 마. 영국(임시마약류), 일본(지정약물) 규제	2
4	ETH-LAD	(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide	가. (구조) ergoline, (효과) 환각제 나. 중추신경계 작용 다. LSD보다 약 1.63배 높은 활성을 가지는 것으로 보고. 사용자 경험에 따르면 오심, 동공확장, 흥분, 환각, 기억력 저하, 환청 등이 나타남 라. 캐나다 발 국제등기우편으로 국내 반입 확인(인천세관,'16.8.) 마. 영국, 일본(지정약물) 규제	2
5	ALD-52	(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide	가. (구조) ergoline, (효과) 환각제 나. 중추신경계 작용 가능성(LSD 유사구조) 다. 사용자 경험에 따르면 각성, 환각, 환청 등의 증상이 나타남 라. 캐나다 발 국제등기우편으로 국내 반입 확인(인천세관,'16.8.) 마. 영국 규제	2
6	Mexedrone	3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	가. (구조) phenethylamine, (효과) 암페타민 나. 중추신경계 작용 다. 사용자 경험에 따르면 다행감, 진정, 발한, 불안, 우울, 각성 등의 증상이 나타남 라. 정보 없음 마. 스웨덴, 일본 규제	2